

## PROVA N° 2

### 1) Cosa si intendono per effetti collaterali di un farmaco?

- a) gli effetti tossici prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un farmaco in dosi superiori a quelle terapeutiche
- b) gli effetti tossici prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un farmaco in dosi inferiori a quelli prevedibili
- c) gli effetti tossici non prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un farmaco in dosi superiori a quelle terapeutiche
- d) gli effetti farmacologici non desiderati ma prevedibili che si verificano nell'ambito dei dosaggi terapeutici

### 2) La melena è:

- a) evacuazione di feci alcoliche
- b) presenza di sangue rosso vivo nelle feci
- c) sanguinamento rettale
- d) nessuna delle precedenti

### 3) Per monitorare la tolleranza ad una nutrizione enterale con sondino naso-gastrico è necessario:

- a) la diuresi oraria
- b) il ristagno gastrico
- c) la presenza o assenza di peristalsi
- d) nessuna delle precedenti

### 4) L'emottisi è:

- a) emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse
- b) emissione di sangue dal cavo orale attraverso la tosse
- c) emissione di sangue con le feci
- d) emissione di sangue con il vomito

**5) Quali tra i seguenti segni non è comunemente associato ad morbo di Parkinson?**

- a) difficoltà di fonazione
- b) difficoltà di deglutizione
- c) scialorrea
- d) afasia

**6) Il sintomo più precoce presentato dai pazienti con malattia di Alzheimer è costituito da:**

- a) disturbi della memoria
- b) ansia e agitazione
- c) comparsa di allucinazioni
- d) comparsa di deliri

**7) Le sanzioni disciplinari previste per l'infermiere dipendente di una Pubblica Amministrazione sono:**

- a) censura, multa, sospensione, radiazione
- b) censura, multa, sospensione, licenziamento
- c) rimprovero verbale e scritto, multa, sospensione, licenziamento
- d) rimprovero scritto, multa e licenziamento

**8) La cartella infermieristica è:**

- a) uno strumento informativo infermieristico di natura orizzontale che accoglie in sé il piano di assistenza infermieristica
- b) un atto pubblico
- c) uno strumento che orienta e sostiene il processo decisionale e facilita la continuità assistenziale infermieristica
- d) tutte le precedenti

**9) Quali segni e sintomi correlati ad una verosimile intossicazione digitalica devono essere prontamente rilevati e segnalati?:**

- a) nausea, vomito e bradicardia
- b) febbre, diarrea con melena
- c) tachicardia e diarrea
- d) ematemesi e melena

**10) L'Evidence Based Nursing (EBN) è:**

- a) l'esplicazione del concetto di ricerca come strumento di lavoro quotidiano della pratica infermieristica
- b) una teoria secondo la quale l'assistenza infermieristica deve basarsi sull'osservazione sistematica dei pazienti e delle loro condizioni
- c) un approccio metodologico attraverso il quale le prestazioni di assistenza infermieristica erogate, sono basate su prove di efficacia
- d) una metodologia che mette in evidenza il rischio clinico legato alle prestazioni di assistenza infermieristica

**11) Le siringhe pronte per l'esecuzione di eparina sottocutanea presentano nel loro interno una bolla d'aria. Quella bolla:**

- a) deve essere eliminata perchè può alterare l'assorbimento del prodotto
- b) facilita la fuoriuscita completa del farmaco durante la somministrazione
- c) deve essere eliminata per valutare la reale dose di somministrazione
- d) può favorire il rischio di embolie gassose

**12) Secondo quanto espresso dal Codice Deontologico dell'infermiere, non viene riportato come compito proprio dell'infermiere:**

- a) la promozione, attraverso l'educazione, di stili di vita sani e di una cultura della salute
- b) il ricorso, per alleviare i sintomi in particolare quelli prevedibili, all'uso di placebo
- c) la continuità assistenziale
- d) la tutela della riservatezza delle informazioni relative alla persona assistita

**13) Nella cura delle piaghe da decubito è fondamentale e irrinunciabile:**

- a) l'eliminazione o la massima attenuazione della pressione sulla piaga
- b) l'utilizzo costante di presidi come materassi antidecubito
- c) l'applicazione di garze grasse sulla piaga
- d) la medicazione con presidi sterili**

**14) Quale condotta deve tenere un infermiere nei confronti di un paziente in cui si sospetti una crisi ipoglicemica?**

- a) somministrare glucosio e chiamare il medico
- b) somministrare glucosio, controllare la glicemia e chiamare un medico
- c) controllare la glicemia, somministrare glucosio e chiamare un medico
- d) chiamare un medico e non fare nulla senza la sua prescrizione

**15) Quale tra le seguenti complicanze è la più frequente della nutrizione parenterale totale (TPN)?:**

- a) il vomito
- b) la febbre
- c) le infezioni
- d) l'iperglicemia

